




USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТБ

НЕМНОГО ИСТОРИИ



Колонии микобактерии туберкулеза (на плотных средах)



- Туберкулёз (от лат. *tuberculum* — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы *Mycobacterium* (*M. tuberculosis* и другими близкородственными видами) или иначе палочками Коха.
- Устаревшее название туберкулёза лёгких — чахотка (от слова чахнуть). В качестве названия туберкулёза почек и некоторых других внутренних паренхиматозных органов (печени, селезёнки), а также желёз (например, слюнных) ранее использовалось слово «бугорчатка». Наружный туберкулёз (кожи, слизистых, лимфоузлов) назывался золотухой.
- Микобактерии ТБ были обнаружены в пирамидах, при раскопках древнейших городов

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ


1. Историки уже давно знают, что согласно древнеиндийским законам Ману мужчинам запрещалось брать в жены женщину с ТБ. А в Вавилоне существовало правило: супруг мог немедленно подать на развод, если его благоверная подхватывала инфекционную болезнь.
2. В 2014 году в Великобритании было впервые задокументировано два случая распространения туберкулеза от кошки к человеку.
3. В Америку туберкулез завезли тюлени. Анализ генома древних микобактерий — возбудителей туберкулеза из человеческих останков в Перу убедил ученых в том, что болезнь была занесена на континент ластоногими млекопитающими.
4. Родиной смертельно опасной болезни является Африка. Кроме того, оказалось, что у возбудителя довольно солидный возраст — ему порядка 70 тыс. лет.
5. Туберкулез пришел в Европу примерно 7 тысяч лет назад
6. Ученые обнаружили: в 52% случаев в районах с высокой долей бычьего туберкулеза скот заражается именно от барсуков

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ТБ

Основной путь передачи ТБ – воздушный.

Основным источником микобактерий туберкулеза является человек с открытой формой туберкулеза (бацилловыделитель).

Особое значение при заражении туберкулезом имеет прямой, длительный и тесный контакт здорового человека с бацилловыделителем. Это может происходить чаще всего в семье, квартире или коллективе, в которых долгое время находится человек с открытой формой туберкулеза.




ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

1. Внутренние факторы: возраст человека (дети, подростки, пожилые), авитаминозы; нервные перенапряжения, физическая усталость и переутомления; проводилась ли вакцинация БЦЖ или нет; многие хронические сопутствующие заболевания (сахарный диабет, язвенная болезнь, психические заболевания, алкоголизм, СПИД и др.).

2. Внешние неблагоприятные факторы: тяжелые условия труда, быта; нерациональный отдых и так далее; голодание, плохое питание; злоупотребление алкоголем, курением; профессиональные вредности; переохлаждение, перегревание; физические травмы.

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА

- Кашель в течение 2 – х и более недель
- Потеря веса
- Периодическое повышение температуры тела (37 -37,5)
- Потливость по ночам
- Общее недомогание и слабость
- Боли в грудной клетке
- Потеря аппетита
- Кровохарканье



Если вы обнаруживаете эти симптомы у человека, обратившегося к вам за помощью, немедленно обратитесь к врачу, и он назначит необходимое обследование!

КАШЛЕВОЙ ЭТИКЕТ



- Прикрывайте рот при кашле или чихании, тыльной стороной руки или рукавом, если у вас нет платка или салфетки
- Мойте руки после чихания и кашля
- Убедите кашляющего человека надеть маску
- Использованные платки, салфетки бросайте в мусорную корзину
- Не плюйте на улице и в других общественных местах

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ТБ





USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
